

Nombre Científico: ***Bolbitius elegans***

2002 - E.Horak

Nombres Comunes: Bolbitio elegante.

Sinónimos:

Comestibilidad: Sin interes

Comestible Tóxica en crudo Sin interes culinario Tóxica Mortal

Temporada de recolección: Primavera Verano Otoño Invierno

Código
971



Taxonomía

División: Basidiomycota

Subdivisión: Agaricomycotina

Clase: Agaricomycetes

Subclase: Agaricomycetidae

Orden: Agaricales

Familia: Bolbitiaceae

Género: Bolbitius

Características Macroscópicas



Esporada: Parda

Sombrero: Pequeño 1-3,5cm, cónico-campanulado (tras madurar, nunca llega a aplanarse), margen ondulado, no estriado. Cutícula lisa, muy viscosa en tiempo húmedo, delicuescente de madura, color amarillo-limón, virando tras madurar a amarillo-ferruginoso o pardo-naranja-ocre.

Himeno: Láminas (escondidas bajo el sombrero), apretadas, anastomasadas (pegadas), delicuescentes al envejecer (como el género Coprinus), de color ocre-naranja y arista blanquecina.

Pie: Alto de 4-11 largo, delgado, fistuloso, ligeramente pruinoso, curvado, amarillo-limón que con la edad vira a amarillo-blancuzco.

Ecología: Saprófita

Carne: Insignificante, con olor fúngico poco intenso.

Habitat Terreno: Pasa desapercibida, oculta bajo plantas herbáceas que le superan en tamaño.

Habitat Vegetación: Pastizales y zonas herbosas nitrificadas con estiércol de ganado.

Notas: Madura muy rápidamente.
Esta especie no se ha descrito hasta el año 2002.
Se caracteriza principalmente por su color amarillo, pie largo y flexuloso, la delicuescencia en la madurez y por los sombreros que nunca llegan a abrirse.
Se puede confundir con Bolbitius titubans, que de adulta extiende el sombrero.

Nombres anteriores (Sinónimos)