

Nombre Científico: **Entoloma hirtipes**

1978 - M.M. Moser

Nombres Comunes: Entoloma de pie veloso - Chivata del Marzulelo

Sinónimos: Agaricus hirtipes-Nolanea hirtipes-Latzinaea hirtipes

Comestibilidad: Tóxica

Comestible  Tóxica en crudo  Sin interes culinario  Tóxica  Mortal

Temporada de recolección:  Primavera  Verano  Otoño  Invierno

**Código**  
**720**



## Taxonomía

División: Basidiomycota

Subdivisión: Agaricomycotina

Clase: Agaricomycetes

Subclase: Agaricomycetidae

Orden: Agaricales

Familia: Entolomataceae

Género: Entoloma

## Características Macroscópicas



Esporada: Rosa oscuro

Sombbrero: Con un diámetro que oscila entre los 3 y los 6 (8) cm en los especímenes adultos, con una forma cónico campanulada en los primeros estadios, abriéndose paulatinamente hasta quedar primero convexo y umbonado y al final casi plano, pero manteniendo un umbón bien definido en su zona central. Se trata de una seta higrófana, lo que da lugar a una cierta variabilidad de color en función de su grado de hidratación, desde el pardo oscuro de algunos ejemplares muy hidratados palidece hacia tonos grises al secarse, pudiendo tener matices oliváceos. Su cutícula suele presentarse radialmente fibrilosa y brillante con lluvia, siendo el margen bastante regular y estriado por transparencia.

Himenio: Láminas adnatas o sublibres de color claro, grisáceo, con laminillas numerosas, las esporas se depositan sobre ellas con la esporulación tiñéndolas de un color rosado sucio.

Pie: Cilíndrico y alargado de color ocre o algo grisáceo en ocasiones, fistuloso y longitudinalmente acanalado de forma perceptible, pruinoso por zonas, sobre todo en la zona superior. Suele presentar rizomorfos blancos en la unión micelial y la base recubierta de un tomento blanquecino que con la edad tiende a extenderse a todo el tercio inferior del propio pie.

Ecología: Saprófito

Carne: Escasa y delgada de color ocre, su olor tiene un componente entre pescado y harina rancia, y podemos decir que su sabor resulta análogo al olor.

Habitat Terreno:

Habitat Vegetación: En primavera bajo coníferas de montaña, en altitudes superiores a los 1000 m.s.n.m., hallándose en la zona una ingente cantidad de ejemplares, por lo que se entiende que se trata de una especie abundante en su hábitat concreto. En otoño puede encontrarse de forma más aislada también bajo planifolios.

Notas: Se conoce a esta especie tóxica como la chivata del *Hygrophorus marzuolus*, dado que suelen coincidir en hábitat y época. Los *Entolomas* de la sección *Nolanea* son muy similares entre sí, esta especie se caracteriza por su hábitat bajo coníferas de montaña, la base del pie blanquecina y las láminas rosa sucio en la madurez. *Entoloma hebes* es una especie más otoñal, más heliófila, de zonas no montañosas y con las esporas más pequeñas. *Entoloma vernum*, especie primaveral también, esta citada bajo *Juniperus* sp. y bajo ciprés de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana*), su olor es herbáceo y carece de queilocistidios mientras que la especie aquí descrita posee un olor harinoso rancio y si tiene queilocistidios.

### Nombres anteriores (Sinónimos)

Nombre anterior	Datador	Año
<i>Latzinaea hirtipes</i>	Kuntze	1891
<i>Agaricus hirtipes</i>	Schumach.	1803
<i>Nolanea hirtipes</i>	P.Kumm.	1871
<i>Rhodophyllus hirtipes</i>	J.E.Lange	1921